PREFEITURA DE PARANAGUÁ
CIDADE MÃE DO PARANÁ

FLUXO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

PROFILAXIA ANTIMICROBIANA

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO (DENTISTA)

Condições que podem predispor o paciente a adquirir endocardite infecciosa.

CONDIÇÕES QUE PODEM PREDISPOR O PACIENTE A ADQUIRIR ENDOCARDITE INFECCIOSA:

1. Doença valvular e prótese valvular cardíaca, enxertos ou dispositivos;
2. Cardiopatia congênita;
3. História prévia de endocardite infecciosa;

PROCEDIMENTO DE RISCO PARA ENDOCARDITE INFECCIOSA:

Procedimentos dentários que requeiram manipulação da região gengival ou periférica dos dentes.

- Extrações dentárias;
- Procedimentos periodontais invasivos;
- Procedimentos que apresentem sangramento abundante;
- Reimplante dental.

NÃO → NÃO PRECISA DE PROFILAXIA

SIM → FARÁ PROCEDIMENTO DE RISCO PARA ENDOCARDITE?

NÃO → NÃO PRECISA DE PROFILAXIA.

SIM → REALIZAR PROFILAXIA ANTIMICROBIANA 1 HORA ANTES DO PROCEDIMENTO, TOMANDO A MEDICAÇÃO NA UNIDADE BASICÁ DE SAÚDE (UBS)

PROFILAXIA ANTIMICROBIANA

➡ CRIANÇAS:

1. OPÇÃO: AMOXICILINA 250MG/5ML: 50MG/KGEM DOSE ÚNICA VO;
2. OPÇÃO: AZITROMICINA 200MG/ML: 10MG/KG EM DOSE ÚNICA;
3. OPÇÃO: CEFALEXINA 250MG/5ML: 50MG/KG EM DOSE ÚNICA;

➡ ADULTOS:

1. OPÇÃO: AMOXICILINA 500MG: 4CP EM DOSE ÚNICA VO;
2. OPÇÃO: AZITROMICINA 500MG: 1CP EM DOSE ÚNICA VO;
3. OPÇÃO: CLINDAMICINA 300MG: 2CP DOSE ÚNICA VO;