

# CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA

## PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

**Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.**

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 10
Legislação	11 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>

# Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Falando sobre paternidade

“Paternidade é uma função própria do pai, com direitos e obrigações familiares importantes. Pai não é coadjuvante da mãe, é seu complementar.

A mãe costuma pedir ajuda ao pai: Ajude aqui, por favor, fique um pouco com as crianças! Ele acha que está apenas ajudando a mãe e não se sente fazendo a sua parte. Muitos pais nada fazem enquanto suas mulheres não pedem. Para os filhos não interessa se é a mãe que está muito ativa ou se o pai é muito passivo. O que eles precisam é de pai e de mãe. Neste ponto, alguns pais reclamam que suas mulheres os tratam como se fossem filhos.

Um pai acomodado, além de não ser um bom exemplo na família, estimula o filho a explorar a mãe. Numa família assim pode se estabelecer uma confusão entre pai acomodado/pai bonzinho e mãe ativa/mãe rabugenta – quando na realidade o pai é negligente e a mãe ativa é obrigada a cobrar as obrigações de todos.

Há muitos homens, no entanto, que já assumem bem mais seu papel. Muito longe de querer substituir a mãe, eles querem tomar parte na educação do filho. Reparei em um passageiro que, em pleno voo, trocava as fraldas de seu bebê, que deveria ter um ano de idade. A mãe não estava presente. Um bebê cuidado pela mãe e pelo pai cresce com menos preconceitos e com menos machismo. Aquela família parece estar desenvolvendo a Alta Performance.”

Texto do livro: “Família de alta performance” do saudoso @icamitiba  
Por Thaís Vilarinho, disponível em <http://www.maeforadacaixa.com.br/falando-sobre-paternidade/>

1. **De acordo com o texto, é possível afirmar que**
  - a) a sociedade em que vivemos, de uma cultura machista, prega a educação feminista, isto é, só a mãe educa.
  - b) estamos acostumados a ver homens trocando fraldas de crianças.
  - c) a autora defende uma educação cuja presença do pai seja ativa.
  - d) pais são acomodados, as mães precisam pedir ajuda sempre.
2. **Análise: “Há muitos homens, no entanto, que já assumem bem mais seu papel.” E assinale a alternativa correta.**
  - a) Neste trecho, “há” pode ser substituído por “tem” sem que haja alteração de sentido.
  - b) Neste trecho, “há” pode ser substituído por “á” sem que haja alteração de sentido.
  - c) Neste trecho, “há” pode ser substituído por “à” sem que haja alteração de sentido.
  - d) Neste trecho, “há” pode ser substituído por “têm” sem que haja alteração de sentido.
3. **Análise: “Aquela família parece estar desenvolvendo a Alta Performance” e assinale a alternativa correta.**
  - a) Há um pronome pessoal neste trecho.
  - b) Há um pronome demonstrativo neste trecho.
  - c) Há um pronome oblíquo neste trecho.
  - d) Há um pronome possessivo neste trecho.

4. **Assinale a alternativa que apresenta um verbo conjugado no Pretérito Imperfeito do Indicativo.**
  - a) “Reparei em um passageiro que, em pleno voo, trocava as fraldas de seu bebê”
  - b) “Aquela família parece estar desenvolvendo a Alta Performance”
  - c) “Um pai acomodado, além de não ser um bom exemplo na família, estimula o filho a explorar a mãe.”
  - d) “quando na realidade o pai é negligente e a mãe ativa é obrigada a cobrar as obrigações de todos.”
5. **Análise: “Um bebê cuidado pela mãe e pelo pai cresce com menos preconceitos e com menos machismo.” E assinale a alternativa que apresenta o núcleo do sujeito da oração.**
  - a) Bebê.
  - b) Mãe.
  - c) Pai.
  - d) Machismo.
6. **Ainda sobre a oração da questão 5, assinale a alternativa correta.**
  - a) É uma oração coordenada.
  - b) É uma oração subordinada.
  - c) É uma oração simples.
  - d) É uma oração composta.
7. **Análise: “A mãe costuma pedir ajuda ao pai: Ajude aqui, por favor, fique um pouco com as crianças!” E assinale a alternativa correta.**
  - a) Os dois pontos foram utilizados de maneira incorreta.
  - b) As vírgulas foram utilizadas de maneira incorreta.
  - c) O ponto de exclamação pode ser substituído por interrogação, sem alterar sentido.
  - d) Não há erros de pontuação neste trecho.
8. **Análise: “Paternidade é uma função própria do pai” e assinale a alternativa que apresenta a classificação correta dos termos em destaque, respectivamente.**
  - a) Adjetivo; artigo; conjunção.
  - b) Adjetivo; numeral; preposição.
  - c) Substantivo; numeral; conjunção.
  - d) Substantivo; artigo; preposição.
9. **Análise: “Um pai acomodado, além de não ser um bom exemplo na família, estimula o filho a explorar a mãe.” E assinale a alternativa correta.**
  - a) Há um advérbio de lugar.
  - b) Há uma interjeição.
  - c) Há um verbo no infinitivo.
  - d) Há um pronome possessivo.
10. **Sobre o último parágrafo, é possível afirmar que**
  - a) no terceiro período, há um sujeito oculto.
  - b) no último período, o sujeito é composto.
  - c) no segundo período, a oração é simples.
  - d) no quarto período, a oração é subordinada.

# Legislação

11. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. De acordo com o artigo 6º da Lei nº 8080/90, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações:
- de vigilância sanitária.
  - de controle da assistência privada.
  - de vigilância epidemiológica.
  - de saúde do trabalhador.
  - de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- Apenas uma está correta.
  - Apenas duas estão corretas.
  - Apenas três estão corretas.
  - Apenas quatro estão corretas.
12. Com base na Lei nº 8080/90, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:
- o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.
  - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
  - o controle de todas as ações nos ambientes residencial e profissional de toda a população, visando a promoção da saúde e afastamento de atitudes que possam causar problemas sanitários.
- Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas II está correta.
  - Apenas I está correta.
  - Apenas II e III estão corretas.
13. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. De acordo com o artigo 23 da Lei nº 8080/90, é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos:
- doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
  - calamidade pública.
  - Estado de Sítio.
  - pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada e ações e pesquisas de planejamento familiar.
  - serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social e demais casos previstos em legislação específica.
- Apenas uma está correta.
  - Apenas duas estão corretas.
  - Apenas três estão corretas.
  - Apenas quatro estão corretas.
14. Sabe-se que os Princípios Organizativos do SUS são formas de concretizar o SUS na prática. Assinale a alternativa que contém o princípio descrito a seguir. Este princípio dispersa a responsabilidade entre as três esferas governamentais (federal, estadual e municipal), tornando-os corresponsáveis pelo sistema de saúde. Ainda, facilita a organização, minimiza a corrupção, auxilia na análise das necessidades da comunidade, entre outros.
- Universalidade.
  - Integralidade.
  - Descentralização.
  - Hierarquização.
15. Sobre a gestão financeira do SUS, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos:
- perfil demográfico da região.
  - perfil epidemiológico da população a ser coberta.
  - características qualitativas da rede privada de saúde na área.
  - desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior.
  - níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais.
  - previsão do plano quinquenal de investimentos da rede.
  - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo.
- Apenas três estão corretas.
  - Apenas quatro estão corretas.
  - Apenas cinco estão corretas.
  - Apenas seis estão corretas.
16. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. De acordo com o artigo 1º da Lei nº 8.142/90, o Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:
- Câmaras de Fiscalização em Saúde.
  - Secretarias de Saúde.
  - Conferência de Saúde.
  - Conselho de Saúde.
- Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas II e III estão corretas.
  - Apenas III e IV estão corretas.
  - Apenas II e IV estão corretas.

17. Com base em seus conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta. A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais, representados respectivamente pelo Conass e Conasems, como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. São itens necessários à Estratégia Saúde da Família, exceto:
- a) existência de equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família) composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo acrescentar a esta composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ ou técnico em saúde bucal.
- b) o número de ACS deve ser suficiente para cobrir pelo menos 85% da população cadastrada, com um máximo de 1500 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe.
- c) cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição. Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe.
- d) cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma eSF, exceção feita somente ao profissional médico, que poderá atuar em, no máximo, duas eSF e com carga horária total de 40 horas semanais.
18. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de iniciativas que busquem a
- ( ) repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS.
- ( ) atuação de maneira integrada e cooperativa entre o SUS e a iniciativa privada promovendo o fortalecimento do SUS e atendimento integral à população.
- ( ) promoção da Cidadania como estratégia de mobilização social tendo a questão da saúde como um direito.
- ( ) garantia de financiamento de acordo com as necessidades do Sistema.
- a) V – V – V – V.
- b) F – F – V – V.
- c) V – F – V – V.
- d) F – V – F – V.
19. Sobre as responsabilidades gerais da gestão do SUS no âmbito municipal, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- ( ) Todo município é responsável pela integralidade da atenção à saúde da sua população, exercendo essa responsabilidade de forma exclusiva.
- ( ) Todo município deve garantir a integralidade das ações de saúde prestadas de forma interdisciplinar, por meio da abordagem integral e contínua do indivíduo no seu contexto familiar, social e de trabalho; englobando atividades de promoção da saúde, prevenção de riscos, danos e agravos; ações de assistência, assegurando o acesso ao atendimento às urgências.
- ( ) Todo município deve assumir a gestão e executar as ações de atenção básica, incluindo as ações de promoção e proteção, no seu território.
- ( ) Todo município deve garantir a estrutura física necessária para a realização das ações de atenção básica, de acordo com as normas técnicas vigentes.
- a) V – V – F – F.
- b) V – F – F – F.
- c) F – F – V – V.
- d) F – V – V – V.
20. Com base em seus conhecimentos sobre a Política Nacional de Promoção a Saúde, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. A PNPS tem por objetivo geral promover a \_\_\_\_\_ e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.
- a) equidade / culturais / ambientais
- b) solidariedade / naturais / ambientais
- c) parcialidade / esportivos / ambientais
- d) maturidade / culturais / empresariais

## Conhecimentos Específicos

21. O envolvimento do sistema nervoso central (SNC) pode ocorrer durante qualquer estágio da sífilis, sendo comuns anormalidades laboratoriais do líquido cefalorraquidiano (LCR) em pessoas infectadas já nos estágios iniciais da doença, pois o *T. pallidum* invade precocemente o SNC dentro de horas a dias após a inoculação. Sobre a neurosífilis, pode-se afirmar, exceto:
- a) o acometimento ocular pode ocorrer em qualquer estrutura do olho, incluindo paralisia de nervos cranianos. A uveíte posterior e a panuveíte são as ocorrências mais comuns.
- b) uma das indicações de punção lombar para pesquisa de neurosífilis é a falha do tratamento clínico sem reexposição sexual.
- c) de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) – 2022, para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) do Ministério da Saúde, a ceftriaxona é uma alternativa para o tratamento, devendo ser realizada na dose de 2g de 12/12h, via endovenosa, por 10 a 14 dias. pacientes tratados para neurosífilis devem ser submetidos à punção líquórica de controle após seis meses do término do tratamento.

22. **As equinocandinas são grandes moléculas de lipopeptídeos, inibidores da síntese de 1-3 glucana, polissacarídeo essencial para a estrutura da célula fúngica. Sobre essa classe antifúngica, assinale a alternativa correta.**
- Em relação à farmacocinética, as equinocandinas apresentam baixa taxa de ligação às proteínas plasmáticas, longa meia-vida e alto metabolismo hepático.
  - As equinocandinas são fungicidas para espécies de *Candida* e fungistáticas para espécies de *Aspergillus*. Não possui atividade antifúngica contra outros fungos filamentosos que não *Aspergillus* spp.
  - A anidulafungina é uma equinocandina de metabolização predominantemente hepática, sendo contra-indicada em casos de falência hepática grave.
  - As equinocandinas são fármacos com baixo perfil de segurança, sendo comuns os efeitos adversos que levam à sua suspensão.
23. **Sobre as infecções sexualmente transmissíveis que se manifestam com lesões genitais em alguma fase da doença, é correto afirmar que**
- a manifestação é caracterizada por úlcera, geralmente única, que ocorre no local de entrada da bactéria, indolor, com base endurecida e fundo limpo. Esse estágio geralmente dura por anos, desaparecendo espontaneamente, independentemente de tratamento.
  - a herpes genital é caracterizada por lesões eritemato-papulosas que rapidamente evoluem para vesículas sobre base eritematosa, dolorosas e de localização variável na região genital. A linfadenomegalia inguinal bilateral também pode estar presente.
  - o cancroide é uma afecção provocada por *Chlamydia trachomatis*, sorotipos L1, L2 e L3. Devido ao mecanismo de autoinoculação, pode se manifestar em lesões de números variáveis, por vezes agrupadas e serpiginosas. Alguns pacientes desenvolvem adenite inguinal, satélite, dolorosa, denominada de bubão.
  - a fase de inoculação do linfogranuloma venéreo pode ser caracterizada por pápula, pústula ou exulceração dolorosa, que desaparece sem deixar seqüela. Em seguida, tem-se a fase de disseminação linfática regional, geralmente caracterizada por linfadenopatia inguinal bilateral, supurativa e dolorosa.
24. **Deve-se levantar suspeita de dengue para todo paciente com febre com duração máxima de 7 dias e, pelo menos, dois dos sintomas: cefaleia, dor retroorbitária, prostração, mialgia e artralgia. De acordo com o protocolo para manejo clínico da dengue no adulto e na criança do Ministério da Saúde, são considerados sinais de alarme da doença, exceto:**
- aumento progressivo do hematócrito.
  - sonolência.
  - lipotímia.
  - febre persistente.
25. **Assinale a alternativa correta a respeito do esquema vacinal para crianças e adolescentes expostos / infectados com HIV.**
- A criança nascida de mãe HIV positiva no período que antecede a definição diagnóstica, devido à presença de anticorpos maternos circulantes da classe IgG anti-HIV (criança exposta) não deve receber nenhuma vacina até definição do diagnóstico.
- As crianças expostas verticalmente ao HIV e as infectadas não podem receber a vacina rotavírus humano atenuada (VORH).
  - Se um adolescente vivendo com HIV chega ao serviço de saúde ainda não vacinado pra hepatite B, deve-se usar o esquema de três doses de vacina hepatite B monovalente, com o dobro da dose.
  - A criança exposta ao HIV que chega ao serviço de saúde ainda não vacinada com BCG poderá receber a vacina se assintomática e sem sinais de imunodepressão.
26. **A criptococose é uma micose profunda com comportamento oportunista, causada por fungos pertencentes ao gênero *Cryptococcus*. Sobre a neurocriptococose, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a seqüência correta.**
- Os sintomas mais frequentes são decorrentes do acometimento encefálico, que é mais comum do que o acometimento meníngeo. Dentre esses sintomas, podemos citar distúrbios visuais, como diplopia, e alterações mentais, como confusão, distúrbios de personalidade e de memória.
  - Uma das opções disponíveis para o diagnóstico laboratorial é o teste de fluxo lateral (LFA, lateral flow assay). A técnica de LFA é imunocromatográfica, já tendo sido aprovada pela ANVISA para uso em líquido e saliva, com alta sensibilidade e especificidade.
  - Um aspecto importante no tratamento do paciente com neurocriptococose é o manejo da hipertensão intracraniana. Para pacientes com pressão intracraniana maior ou igual a 25 cm de H<sub>2</sub>O, é indicada punção líquórica de alívio.
  - Para a fase inicial de tratamento, denominada como fase de indução, deve-se associar anfotericina B com fluconazol como primeira escolha de tratamento.
  - A introdução dos antirretrovirais deve ser postergada nos pacientes com infecção pelo HIV/aids e com neurocriptococose até que haja evidência de resposta clínica em relação ao tratamento antifúngico devido ao risco de síndrome inflamatória da reconstituição imunológica, com aumento no risco de mortalidade.
- V – F – V – F – F.
  - F – V – V – V – V.
  - F – F – F – F – V.
  - F – F – V – F – V.
27. **As micobactérias não tuberculosas (MNT) encontram-se dispersas na natureza e, ao contrário das espécies do complexo *Mycobacterium tuberculosis*, apresentam patogenicidade variável. De acordo com características fenotípicas, as MNT podem ser classificadas com base na produção de pigmentos carotenóides e no tempo de crescimento em meio de cultura. São consideradas MNT de crescimento rápido, exceto:**
- M. abscessus*
  - M. kansasii*
  - M. fortuitum*
  - M. chelonae*

28. **A tuberculose pode manifestar-se sob diferentes apresentações clínicas, relacionadas com o órgão acometido. Sobre tuberculose extrapulmonar, assinale a alternativa correta.**
- Na tuberculose pleural, o líquido pleural tem características de exsudato, predomínio de linfócitos e baixo rendimento tanto da pesquisa de BAAR quanto da cultura, de forma que níveis de adenosina deaminase (ADA) no líquido pleural têm sido aceitos como critério diagnóstico.
  - A tuberculose meningoencefálica é a forma mais frequente de tuberculose extrapulmonar em pessoas vivendo com HIV. Clinicamente, pode ser subaguda ou crônica, podendo apresentar sinais focais relacionados a síndromes isquêmicas locais ou ao envolvimento de pares cranianos.
  - A tuberculose pericárdica tem apresentação clínica subaguda e geralmente se associa a tuberculose pulmonar. Na maioria das vezes, é diagnosticada em contexto de tamponamento cardíaco.
  - A tuberculose óssea é mais comum em pacientes adultos jovens. Atinge mais as articulações coxofemoral e do cotovelo e a coluna vertebral, principalmente a coluna torácica baixa e lombar.
29. **É critério de inclusão para tratamento de hepatite B sem agente Delta, independentemente dos resultados de HBeAg, HBV-DNA e ALT, exceto:**
- coinfecção com HIV.
  - história familiar de CHC.
  - hepatite aguda grave (coagulopatias ou icterícia por mais de 14 dias).
  - elastografia hepática > 5,0 kPa.
30. **Um paciente de 30 anos de idade, previamente hígido, foi diagnosticado com hepatite C crônica, com PCR HCV 2.138.444UI/mL e genótipo 1A. Tem elastografia hepática transitória com resultado de 5,6kPa e nunca foi submetido à tratamento prévio com antiviral de ação direta. Sobre as alternativas terapêuticas, assinale a alternativa correta.**
- Sofosbovir + ledipasvir por 12 semanas.
  - Sofosbovir + ledipasvir + ribavirina por 12 semanas.
  - Sofosbovir + velpatasvir por 8 semanas.
  - Sofosbovir + velpatasvir + ribavirina por 12 semanas.
31. **A leptospirose é uma zoonose, caracterizada como doença generalizada, febril, causada por espiroquetas patogênicas do gênero Leptospira. Sobre a doença, assinale a alternativa correta.**
- A transmissão ao homem pode ocorrer por contato direto com sangue, tecidos, órgãos ou urina de animais infectados, ou, por via indireta, através do contato com água ou solo contaminados com a urina dos animais portadores.
  - A “Síndrome de Weil” é um espectro clínico possível, caracterizado pela tríade insuficiência renal, hemorragias e icterícia, com aumento significativo de bilirrubinas às custas de porção indireta.
  - Mielites, neuropatias periféricas e meningites são complicações de difícil cura e que geralmente deixam sequelas.
  - Dose única de azitromicina pode ser empregada como profilaxia pré-exposição em casos selecionados.
32. **A esquistossomose é uma doença produzida pelo *Schistosoma mansoni* e transmitida por contato com água contaminada por larvas (cercárias) que se reproduzem dentro dos caramujos do gênero *Biomphalaria*. Sobre a doença, analise as alternativas e assinale a alternativa correta.**
- A forma aguda da doença é aquela que se segue, geralmente, em um período de seis a oito semanas ao primeiro contato com coleções hídricas que contenham cercárias. São comuns exantema maculopapular, diarreia, dor e distensão abdominal.
  - A forma hepatointestinal é a forma clínica mais comum dentro da fase crônica da esquistossomose. A diarreia é a sua manifestação mais frequente. Geralmente, ela é intermitente, por vezes acompanhada de muco ou sangue, podendo alternar-se com períodos de constipação.
  - O diagnóstico laboratorial da esquistossomose pode se dar pelo encontro de ovos do parasito em exame de fezes ou em cortes de tecidos obtidos por biópsia. O método de Kato-Katz é uma das técnicas parasitológicas adequadas e permite a contagem de ovos de *S. mansoni* nas amostras de fezes e avaliação estimada da carga parasitária.
  - O praziquantel é a medicação utilizada no tratamento da esquistossomose. Está associada à efeitos adversos importantes, sendo pouco tolerada pelos pacientes.
- Apenas I e II estão corretas.
  - Apenas I e III estão corretas.
  - Apenas I, II e III estão corretas.
  - Todas estão corretas.
33. **Criança de 3 anos, feminina, brincava com cão no quintal da casa de sua avó quando foi mordida pelo mesmo em região de mento, com ferimento profundo. Mãe negou realização de vacinação antirrábica anterior na criança. O local onde ocorreu o acidente é considerado área de raiva controlada e o cão é passível de observação. Em relação a profilaxia da raiva, deve-se**
- manter o animal em observação por 10 dias. Se permanecer vivo e saudável, suspender a observação no 10º dia e encerrar o caso. Se morrer, desaparecer ou apresentar sinais de raiva, indicar vacina nos dias 0, 3, 7 e 14.
  - manter o animal em observação por 10 dias. Se permanecer vivo e saudável, suspender a observação no 10º dia e encerrar o caso. Se morrer, desaparecer ou apresentar sinais de raiva, indicar vacina nos dias 0, 3, 7 e 14 e soro antirrábico.
  - manter o animal em observação por 10 dias. Se permanecer vivo e saudável, suspender a observação no 10º dia e encerrar o caso. Se morrer, desaparecer ou apresentar sinais de raiva, indicar vacina nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.
  - iniciar imediatamente vacina nos dias 0, 3, 7 e 14 e soro antirrábico.

34. O citomegalovírus (CMV) permanece em estado latente após a infecção primária. No contexto da infecção pelo HIV, o risco de reativação da doença aumenta quando o LT-CD4+ se reduz a menos de 100 céls/mm<sup>3</sup>. Sobre a doença citomegálica em paciente vivendo com HIV/AIDS, analise as alternativas e assinale a alternativa correta.
- I. Os principais sítios de infecção são retina e vias biliares, podendo ser acometidos também pulmões, aparelho digestivo e sistema nervoso central.
- II. Resultados negativos da antigenemia ou PCR plasmático não excluem a doença por CMV em órgãos.
- III. Recomenda-se diagnóstico precoce de retinopatia por CMV por meio de fundoscopia rotineira em paciente vivendo com HIV com LT-CD4+ <50 céls/mm<sup>3</sup>.
- IV. É recomendada profilaxia secundária para doença gastrointestinal com ganciclovir, que deve ser mantido até que se atinja persistência de LT-CD4+ >100 céls/mm<sup>3</sup> por mais de 3-6 meses.
- a) Apenas I, II e III estão corretas.  
b) Apenas II e III estão corretas.  
c) Apenas I, III e IV estão corretas.  
d) Todas estão corretas.
35. Em alguns pacientes com endocardite infecciosa, as hemoculturas, cultura da vegetação valvar ou de produto de embolia séptica podem resultar negativas. Sobre endocardites com culturas negativas, pode-se afirmar, exceto:
- a) *Coxiella burnetii* e *Bartonella spp.* são possíveis etiologias nesse contexto. A sorologia é um método seguro para o diagnóstico das endocardites por esses agentes.  
b) a administração de antibióticos antes da coleta das culturas é uma das causas dessa apresentação.  
c) os microrganismos do grupo HACEK são etiologias frequentes dessa apresentação, por dificilmente se desenvolverem nas hemoculturas habituais.  
d) *Legionella spp.* e *Brucella spp.* são etiologias possíveis de endocardite com cultura negativa, com raros casos descritos.
36. Sobre medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea relacionadas a cateteres centrais, assinale alternativa correta.
- a) Na inserção do cateter, a degermação prévia à antissepsia da pele não é recomendada rotineiramente, estando reservada para casos onde exista sujidade visível.  
b) Na inserção do cateter, a remoção dos pelos, quando necessária, deverá ser realizada com tricotomizador elétrico ou lâmina de barbear.  
c) Na manutenção do cateter, é recomendado realizar a troca da cobertura com gaze e fita adesiva estéril a cada 48 horas e a troca da cobertura estéril transparente a cada cinco dias.  
d) Cateteres inseridos em situação de emergência ou sem a utilização de barreira máxima devem ser trocados para outro sítio assim que possível, não ultrapassando 24 horas.
37. Segundo nota técnica número 02/2021 da ANVISA, sobre Critérios Diagnósticos das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde – 2021, são infecções de sítio cirúrgico de notificação nacional obrigatória as que ocorrem após, exceto:
- a) cirurgia cesariana.  
b) implante de prótese mamária.  
c) implante de prótese de quadril.  
d) cirurgia bariátrica.
38. Sobre o tratamento da leishmaniose tegumentar, analise os cenários e assinale a alternativa correta.
- a) Para uma paciente gestante de 32 anos com leishmaniose cutânea localizada por *Leishmania braziliensis*, com lesão múltipla, o tratamento de primeira escolha é com anfotericina B lipossomal.  
b) Para um paciente de 35 anos com leishmaniose cutânea localizada por *Leishmania braziliensis*, com lesão única de 5cm em seu maior diâmetro, o antimonialato de meglumina intralesional é uma das opções de primeira escolha para tratamento.  
c) Para um paciente de 25 anos, proveniente de área onde há predomínio de *Leishmania guyanensis* com leishmaniose cutânea localizada, com lesão múltipla, o tratamento de primeira escolha é com desoxicolato de anfotericina B.  
d) Para uma paciente de 55 anos com leishmaniose cutânea disseminada, o tratamento de primeira escolha é com antimonialato de meglumina.
39. O vírus varicela-zóster (VVZ) causa infecções primárias, latentes e recorrentes. O herpes zóster consiste na reativação da infecção latente. Sobre a doença, assinale a alternativa correta.
- a) É menos comum em crianças, sendo mais grave nesse grupo e mais frequentemente associado à neuralgia pós-herpética.  
b) O envolvimento do VII par craniano leva a uma combinação de paralisia facial periférica e rash em região peri-oral denominada síndrome de Ramsay-Hunt.  
c) A infecção secundária por bactérias piogênicas constitui uma das mais frequentes complicações, que incluem abscessos, linfadenite e celulite.  
d) Para pacientes imunocomprometidos, mulheres grávidas e crianças menores de 2 anos, está indicada a imunoglobulina específica contra varicela zóster como profilaxia pós-exposição.



40. Nos dias atuais, diante dos avanços de tratamento das doenças neoplásicas, incluindo as onco-hematológicas, cada vez mais pacientes são submetidos à quimioterapia de indução de remissão de leucemias e linfomas, podendo apresentar estado de neutropenia febril como intercorrência. A respeito da abordagem de pacientes neutropênicos febris, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- ( ) Em relação à etiologia, embora infecções por bactérias gram-positivas predominassem há algumas décadas, a maioria das infecções documentadas atualmente são causadas por bactérias gram-negativas.
  - ( ) O exame físico deve ser realizado minuciosamente, à procura dos mais discretos sinais ou sintomas de infecção dos diversos aparelhos, incluindo avaliação oral e de região perianal, com toque retal em pacientes masculinos para pesquisa de sinais de prostatite.
  - ( ) Klatersky e colaboradores, em seu estudo (The multinational association for supportive care in cancer risk index score/MASCC), estabeleceram e validaram um sistema de pontuação para identificar, no momento da apresentação da febre, aqueles pacientes com baixo risco de complicações, incluindo o risco de mortalidade. No escore MASCC, idade menor que 60 anos, ausência de hipotensão e ausência de desidratação são alguns dos fatores associados com baixo risco de complicações e maior taxa de resultados favoráveis.
  - ( ) A neutropenia febril é uma emergência médica que requer avaliação e tratamento imediatos. Assim, a terapia antibacteriana empírica deve ser iniciada o mais rápido possível, imediatamente após a obtenção de hemoculturas e antes de qualquer outra investigação ser concluída.
  - ( ) Se a febre persistir por mais de cinco dias e a reavaliação não revelar a origem do problema, deve-se considerar a possibilidade de infecção fúngica – mais comumente causadas por *Aspergillus spp* e *Cryptococcus spp*. Nesse cenário, deve-se considerar adição de agente anti-fúngico para pacientes de alto risco com neutropenia > 7 dias.
- a) V – F – V – F – F.
  - b) F – F – V – V – F.
  - c) F – V – V – V – F.
  - d) V – F – V – V – V.