


Crise Hipertensiva



1. Captopril (25 a 50 mg)
2. Clonidina (0,1 a 0,3 mg)
3. Caso a principal hipertensão sistêmica (HAS) não diagnosticada ou não tratada considerar aviação médica e seguimento ambulatorial em UBS

Edema agudo de pulmão:

1. Furosemida 1 mg/kg + nitroprussiato (2 ml + 248 ml de SG 5%); 1,5-2 mg/kg/min (0,25-0,5 mcg/kg/min)
2. VNI precoce
3. Morfina (2-5 mg EV a cada 15-30 minutos, dependendo do quadro clínico do paciente)

Encefalopatia hipertensiva

1. Ringer lactato: 20-30 ml/kg, dependendo do estado volêmico do paciente
2. Nitroprussiato de sódio: 2 mg/kg/min (0,5-1 mcg/kg/min) EV contínua
- Iniciar infusão 5-10 ml/hora.
3. ACIONAR SAMU – VAGAS

Eclâmpsia

1. Sulfato de magnésio: 8 ml + diluída EV lentamente (15-20 minutos), seguida de 460 ml de SG 5% EV (25-50 ml/min)
2. Nitroprussiato de sódio: 2 mg/kg/min (0,5-1 mcg/kg/min) EV contínua
3. Dexametasona: 6 mg IM de 12 horas
4. ACIONAR SAMU – VAGAS

Síndrome Aórtica Aguda

1. Morfina (10MG/1ML): 1 Ml IM
- Administrador 2-4 ml EV. Pode repetir a dose até duas vezes; após 4-6 horas.
- Fentanil (50 mcg/ml): 2 ml IM
2. Metoprolol: 5 mg EV em 5-10 minutos; pode repetir a dose até duas vezes; após 4-6 horas.